

1. Si considerino i vettori $\vec{u} = (2, 1)$ e $\vec{v} = (1, 3)$. Calcolare e disegnare i vettori $2\vec{u} + \vec{v}$ e $-2\vec{u} - 3\vec{v}$.
2. Trovare la somma di $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{c} = \begin{pmatrix} -8 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{d} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$, geometricamente usando un poligono vettoriale. Verificare il risultato con una somma algebrica.
3. Dati i vettori $\vec{a} = (2, 1)$, $\vec{b} = (-3, 2)$, calcolare $\vec{a} - \vec{b}$, $|\vec{a}|$, $|\vec{b}|$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$.
4. (Bramanti-Pagani-Salsa, p. 55, Esercizio 5) Tra i seguenti vettori, individuare eventuali coppie di vettori paralleli o perpendicolari:

$$(2, -1, 1), \quad (1, 2, -1), \quad (1, 4, 2), \quad (2, 4 - 2).$$

5. (Bramanti-Pagani-Salsa, p. 55, Esercizio 6) Dati i vettori

$$\mathbf{v} = (1, 2, 3) \quad \text{e} \quad \mathbf{w} = (-2, 0, 1),$$

calcolare i vettori $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ e $2\mathbf{v} - 3\mathbf{w}$, il modulo del vettore $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ e il versore del vettore $2\mathbf{v} - 3\mathbf{w}$.

6. Dato il vettore $\vec{a} = (1, 3)$, determinare la sua proiezione secondo la direzione del vettore $\vec{b} = (1, 1)$.
7. Trovare l'angolo tra i vettori $\vec{p} = (3, 0, -4)$, $\vec{q} = (-2, 2, 1)$.
8. Dati i tre punti $A = (-1, 0, 2)$, $B = (-2, 1, 3)$ e $C = (0, 1, 0)$, calcolare
 - (a) i vettori \vec{AB} e \vec{AC} ;
 - (b) la distanza tra i punti A e B ;
 - (c) il prodotto scalare di \vec{AB} e \vec{AC} ;
 - (d) l'angolo BAC in gradi e in radianti.
9. (Bramanti-Pagani-Salsa, pp. 70–71, Esercizio 22) Verificare che e il seguente “prodotto scalare” in \mathbb{R}^2 soddisfa effettivamente gli assiomi del prodotto scalare:

$$\langle (x_1, y_1), (x_2, y_2) \rangle = x_1x_2 + x_1y_2 + y_1x_2 + 4y_1y_2.$$

Rispetto a questa struttura di spazio vettoriale con prodotto interno, rispondere alle seguenti domande:

- (a) I vettori $(1, 0)$ e $(0, 1)$ sono ortogonali?
 - (b) Quanto vale $\|(1, 1)\|$? (Si ricordi che $\|(1, 1)\| = \sqrt{\langle (1, 1), (1, 1) \rangle}$.)
 - (c) Qual è la distanza tra $(1, 0)$ e $(0, 1)$?
10. Dati i vettori $\mathbf{v} = (2 - i, 4 + 2i)$ e $\mathbf{w} = (-i, 2 - 2i)$ dello spazio vettoriale \mathbb{C}^2 su \mathbb{C} con il prodotto hermitiano standard, calcolate $|\mathbf{v}|$, $|\mathbf{w}|$ e il prodotto hermitiano $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$.
 11. Sia $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ un vettore arbitrario in \mathbb{R}^n . Usando la disuguaglianza di Cauchy-Buniakovskii-Schwarz, provare che

$$(v_1 + v_2 + \dots + v_n)^2 \leq n(v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2).$$

Trovare un vettore $\vec{v} \neq \vec{0}$ tale che nella precedente disuguaglianza valga il segno di uguale.