

GEOMETRIA ANALITICA

EQUAZIONE DELLA RETTA


Teoria in sintesi

- Dati due punti A e B nel piano, essi individuano (univocamente) una retta.
- La retta è rappresentata da un'equazione di primo grado in due variabili:

(*) $ax+by+c=0$ con a,b,c numeri reali
che è detta *equazione generale* della retta.

Tutti e soli i punti le cui coordinate soddisfano l'equazione (*) cioè le soluzioni dell'equazione, sono i punti del piano appartenenti alla retta

- Nell'equazione (*) notate il diverso significato che assumono le lettere a,b,c (*parametri o costanti*) ed x,y (*variabili*)
- Ogni equazione del tipo : $y=mx+q$ rappresenta una retta (*equazione esplicita della retta*). m è detto *coefficiente angolare*, $m=-a/b$, mentre q è l'*ordinata all'origine* (l'ordinata del punto in cui la retta incontra l'asse y)
- Dati due punti $A(x_1,y_1)$ e $B(x_2,y_2)$, $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ con $x_2 \neq x_1$




- Se $m=0$ l'equazione $y=q$ rappresenta una retta parallela all'asse x (che coincide con l'asse x nel caso $q=0$)
- Le rette parallele all'asse y non sono rappresentate nell'equazione in forma esplicita
- L'equazione: $y-y_0=m(x-x_0)$ è l'equazione di una *famiglia di rette di centro P* cioè rappresenta tutte le rette (tranne quella parallela all'asse y) che passano per il punto $P(x_0,y_0)$

Esempi

1. Grafico della retta

Tracciare nel piano cartesiano il grafico della retta: $3x-2y+1=0$

- Cerchiamo due punti appartenenti alla retta, cioè due punti che siano soluzione dell'equazione data. Si sceglie un valore di x (ad es. $x=1$) e, sostituendo nell'equazione si trova il corrispondente valore di y ($y=2$)
- Ripetiamo l'operazione con un secondo valore di x e calcoliamo il corrispondente valore di y . $x=3, y=5$
- A questo punto tracciamo il grafico:



2. Stabilire quali dei seguenti punti appartengono alla retta: $y=2x-1$

- $A(1,1)$.

Appartiene alla retta data perché sostituendo le sue coordinate nell'equazione si ottiene $1=2-1$ e dunque A la soddisfa

- $B(-2,3)$

Non appartiene perché sostituendo le sue coordinate nell'equazione si ottiene $3=-4-1$ e dunque B non la soddisfa

3. Scrivere l'equazione della retta passante per $A(-3,1)$ e $B(2,-2)$

- $m = \frac{-2-1}{2+3} = \frac{-3}{5}$

- per calcolare q , sostituiamo il coefficiente angolare trovato e le coordinate di uno dei due punti dati

nell'equazione $y=mx+q$: $-2 = \frac{-6}{5} + q$ da cui si ottiene $q=-4/5$

- la retta cercata è: $y=(-3/5)x-4/5$

- allo stesso risultato si poteva arrivare utilizzando la formula della retta passante per due punti (vedi

appendice): $\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x-x_2}$ che applicata nel nostro caso ci porta all'equazione.

$$\frac{y-1}{-2-1} = \frac{x+3}{2+3}, \text{ cioè } 5y+3x+4=0$$

4. Dire se i punti $O(0,0)$ e $P(1,-3)$ stanno dalla stessa parte o da parti opposte rispetto alle rette $r)x+y+5=0$ ed $s)3x-y+8=0$

- La retta r individua due semipiani: uno dato dall'insieme dei punti del piano per cui risulta $x+y+5>0$, l'altro dai punti per cui $x+y+5<0$ (la retta r è individuata dai punti per cui $x+y+5=0$)
- La retta s individua i due semipiani: $3x-y+8>0$ e $3x-y+8<0$
- Sostituendo le coordinate dei punti dati nelle disuguaglianze precedenti, si ottiene:

$O(0,0)$: $0+0+5>0$ vera

$P(1,-3)$ $1-3+5>0$ vera


Dunque P ed O stanno dalla stessa parte rispetto alla retta r .

Analogamente per s si trova:

$O(0,0)$ $0+0+8>0$ vera

$P(1,-3)$ $3+3+8>0$ vera. Dunque P ed O stanno dalla stessa parte anche rispetto ad s

Verifichiamolo graficamente:




5. La funzione $f(x)$ è data dalla legge:

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 1 & \text{per } x > 0 \\ -2 & \text{per } x < 0 \end{cases}$$

Tracciarne il grafico

- Si tratta di disegnare due semirette: una (la retta $y=3x-1$) definita per $x > 0$, l'altra (la retta $y=-2$) per $x < 0$



- La funzione è definita su tutto l'asse reale esclusa l'origine

6. Scrivere l'equazione della famiglia di rette di centro $P(-2,4)$

- L'equazione avrà la forma: $y - y_0 = m(x - x_0)$. Nel nostro caso: $y - 4 = m(x + 2)$
Cioè $y = mx + 2m + 4$

Osservazione

Le infinite rette di equazione $y = mx + q$ con m fissato, rappresentano al variare di q la famiglia delle rette parallele alla retta passante per l'origine di equazione $y = mx$.

Ad es. l'equazione $y = 4x + q$ rappresenta la famiglia di rette parallele alla retta per l'origine $y = 4x$


TEST DI AUTOVALUTAZIONE

- 1) Scrivere l'equazione della retta passante per i punti: $A(-1,2)$ e $B(3,-1)$
- 2) Scrivere l'equazione della retta passante per i punti: $A(1,6)$ e $B(1,23)$

- 3) Tracciare il grafico della funzione:
$$f(x) = \begin{cases} x & \text{per } x \leq 0 \\ -x & \text{per } 0 < x < 2 \\ -1 & \text{per } x \geq 2 \end{cases}$$
- 4) Scrivere l'equazione del fascio di rette di centro $P(1/2, -7)$
- 5) Riconoscere tra le seguenti equazioni quali rappresentano una famiglia di rette passanti per un punto e quali una famiglia di rette parallele ad una retta per l'origine:
- $3x+5y+k=0$
 - $2y+3mx-m=0$
 - $-4y+hx+2=0$
 - $kx+ky-2k+3=0$ con $k \neq 0$

SOLUZIONI

- $3x+4y-5=0$
- $x=1$
-




- $y+7=m(x-1/2)$
- rette parallele a $y=(-3/5)x$
 - $2y=-m(3x-1)$, famiglia di rette con centro $P(1/3, 0)$
 - $2(2y-1)=hx$, famiglia di rette con centro $P(0, 1/2)$
 - $y=-x+2k-3$, rette parallele a $y=-x$

ESERCIZI DI APPROFONDIMENTO

- Scrivere le equazioni delle rette passanti per i punti $A(1/3, 2)$ e $B(-2, -4/5)$ $[6x-5y+8=0]$
- Scrivere le equazioni delle rette passanti per i punti $A(0, 0)$ e $B(3, -2)$ $[y=(-2/3)x]$
- Nel fascio di rette parallele alla retta $3x+2y=0$, determinare l'equazione della retta che passa per $P(1, -5)$ $[3x+2y+7=0]$
- Scrivere l'equazione della famiglia di rette di centro $A(-1, 1)$ e determinare la retta passante per $B(0, 2)$ $[x-y+2=0]$
- Dire se i punti $O(0, 0)$ e $P(1, -3)$ stanno dalla stessa parte o da parti opposte rispetto alle rette:
 - $2x-y+5=0$,
 - $x-3y-5=0$,
 - $10x+24y+15=0$ $[dalla\ stessa\ parte\ solo\ rispetto\ ad\ r]$

LA CIRCONFERENZA

- La *circonferenza* è il luogo geometrico dei punti equidistanti da un punto C , detto *centro*.
- Si ottiene tagliando un cono con un piano perpendicolare al suo asse.
- La distanza fra ognuno dei suoi punti e il centro è il *raggio* della circonferenza.



- Note le *coordinate del centro* $C(\alpha; \beta)$ e la *misura r del raggio*, l'equazione della circonferenza è allora

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = r^2 \quad (\text{equazione canonica})$$

- Svolgendo i calcoli nell'equazione precedente si ottiene:

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \quad (*)$$

dove $a = -2\alpha$, $b = -2\beta$, $c = \alpha^2 + \beta^2 - r^2$ (e dunque $r^2 = (a^2/4) + (b^2/4) - c$)

- Assegnata un'equazione di secondo grado in cui i coefficienti di x^2 e di y^2 sono uguali tra loro, non è detto che essa rappresenti sempre una circonferenza. Infatti l'equazione (*) rappresenta una circonferenza solo se $(a^2/4) + (b^2/4) - c > 0$ cioè se il quadrato del raggio è positivo

Esempi

1. Determinare l'equazione della circonferenza di centro $C(2, -1)$ e raggio $r=3$

- Utilizzando l'equazione canonica della circonferenza, possiamo scrivere:
 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9$, che è l'equazione richiesta


2. Dire se le seguenti equazioni rappresentano o no delle circonferenze ed in caso affermativo determinare centro e raggio:

- $x^2 + y^2 - 8x + 6y = 0$. Calcoliamo il centro $C(4, -3)$ ed il raggio $r^2 = 16 + 9 = 25 > 0$ e quindi l'equazione data è una circonferenza di centro C e raggio 5
- $x^2 + y^2 + 10x - 4y + 29 = 0$ Calcoliamo il centro $C(-5, 2)$ ed il raggio $r^2 = 25 + 4 - 29 = 0$ e quindi l'equazione data non rappresenta una circonferenza
- $x^2 + y^2 - 2x + y + 9 = 0$ Calcoliamo il centro $C(1, -1/2)$ ed il raggio $r^2 = 1 + 1/4 - 9 < 0$ e quindi non è una circonferenza
- $2x^2 + 3y^2 - 2x + 3y - 1 = 0$. Non è una circonferenza perché i coefficienti di x^2 e di y^2 non sono uguali
- $4x^2 + 4y^2 + 25y = 0$. Per poter calcolare il centro ed il raggio dividiamo l'equazione per 4 ed otteniamo:
 $x^2 + y^2 + (25/4)y = 0$ da cui $C(-25/8, 0)$ ed $r^2 = (-25/8)^2$ cioè $r = 25/8$

3. Stabilire se il punto A(1,-2) è interno o esterno alle circonferenze:

- $x^2+y^2=1$. Il punto A è esterno alla circonferenza data se $x_1^2+y_1^2>1$, interno se $x_1^2+y_1^2<1$ quando sostituiamo al posto di x_1 ed y_1 le coordinate di A. Nel nostro caso risulta $1+4>1$ e dunque A è esterno alla circonferenza
- $x^2+y^2-10x+8y=0$. Come nel caso precedente, sostituendo le coordinate di A nella circonferenza, otteniamo $1+4-10-16<0$ e dunque il punto è interno alla circonferenza data
- $x^2+y^2=5$. In questo caso : $1+4=5$ e quindi il punto sta sulla circonferenza.

Graficamente i tre casi precedenti si rappresentano:



TEST DI AUTOVALUTAZIONE

1. Stabilire quali delle seguenti equazioni rappresentano delle circonferenze:

- $x^2+y^2-2x+4y+7=0$
- $2x^2+2y^2-x+5y-1=0$
- $x^2+y^2-2x=0$

2. Determinare la circonferenza avente centro C(-1,-1/2) ed $r=3/2$

3. Stabilire se il punto A(1,-2) appartiene oppure no alla circonferenza $x^2+y^2+2x-4y+1=0$. In caso negativo stabilire se è interno o esterno

SOLUZIONI

1.

- no.
- $C(1/4, -5/4)$ ed $r=\sqrt{34}/4$
- $C(1,0)$ ed $r=1$

2. $x^2+y^2+2x+y-1=0$

3. E' esterno

ESERCIZI DI APPROFONDIMENTO

- per quali valori di h parametro reale, l'equazione $x^2+y^2-2x+hy+h=0$ rappresenta una circonferenza?
Scelto uno di tali valori, determinare centro e raggio
[$h \neq 2$; per $h=2$ C(1,-1) e raggio nullo]
- determinare la circonferenza avente come diametro il segmento AB con A(2,-6) e B(-4,2).
(suggerimento: il punto medio del segmento AB è il centro della circonferenza ed il raggio è dato dal segmento CA o dal segmento CB)
[$x^2+y^2+2x+4y-20=0$]
- scrivere l'equazione della circonferenza che passa per l'origine ed ha centro in C(6,-8)
[$(x-6)^2+(y+8)^2=100$]

APPENDICE

Riportiamo di seguito alcune formule di geometria analitica che può essere utile ricordare.

LA RETTA

1. Rette particolari

- Se $a=0$ la retta è parallela all'asse x ed ha equazione : $by+c=0$ (retta orizzontale)
- Se $b=0$ la retta è parallela all'asse y ed ha equazione : $ax+c=0$ (retta verticale)
- Se $c=0$ la retta passa per l'origine

2. Condizione di allineamento di tre punti. Dati tre punti $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$, $C(x_3,y_3)$ che abbiano

ascisse diverse, sono allineati se e solo se: $\frac{y_2 - y_1}{y_3 - y_1} = \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1}$

3. Retta per due punti . Dati due punti $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ con $x_1 \neq x_2$ ed $y_1 \neq y_2$, allora la retta che passa

per A e B ha equazione: $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$

4. Equazioni delle bisettrici degli assi cartesiani. Bisettrice del primo e terzo quadrante : $y=x$ Bisettrice del secondo e quarto quadrante: $y=-x$

5. Rette parallele. Due rette di equazioni $y=mx+q$ e $y=m'x+q'$ sono parallele se $m=m'$. Se le rette sono nella forma $ax+by+c=0$ e $a'x+b'y+c'=0$, sono parallele se $ab'=a'b$

6. Rette perpendicolari . Due rette di equazioni $y=mx+q$ e $y=m'x+q'$ sono perpendicolari se $mm'=-1$

1 Se le rette sono nella forma $ax+by+c=0$ e $a'x+b'y+c'=0$, sono perpendicolari se $aa'+bb'=0$

7. Distanza di un punto da una retta. La distanza di un punto $P(x_0,y_0)$ dalla retta r è data da:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \text{ oppure } d = \frac{|y_0 - mx_0 - q|}{\sqrt{m^2 + 1}}$$

a seconda che la retta sia scritta in forma implicita o in forma esplicita

LA CIRCONFERENZA

1. Si segnalano i seguenti casi particolari dell'equazione $x^2+y^2+ax+by+c=0$

$a=0$, il centro appartiene all'asse y ;

$b=0$, il centro appartiene all'asse x ;

$c=0$, la circonferenza passa per l'origine degli assi.

2. Determinazione dell'equazione della circonferenza. Per determinare l'equazione di una circonferenza è necessario determinare i tre parametri (a, b, c) dell'equazione generale di una circonferenza.

Ad esempio citiamo i seguenti casi:

- sono note le coordinate del centro e il raggio;
- sono note le coordinate degli estremi di un diametro;
- la circonferenza passa per un punto e sono note le coordinate del centro;
- la circonferenza passa per tre punti non allineati;
- la circonferenza passa per due punti e il centro appartiene a una retta nota;
- sono note le coordinate del centro e la circonferenza è tangente a una retta nota.

Vediamo un esempio per chiarire le idee.

Esempio

Determinare l'equazione della circonferenza che passa per $A(0,3)$, $B(-4,1)$, $C(1,1)$.

Si parte dall'equazione $x^2+y^2+ax+by+c=0$ e si impone che sia soddisfatta dalle coordinate dei tre

punti dati. Si ottiene allora il sistema:
$$\begin{cases} 9+3b+c=0 \\ 16+1-4a+b+c=0 \\ 1+1+a+b+c=0 \end{cases}$$
 che come soluzioni ha i valori
$$\begin{cases} a=3 \\ b=-2 \\ c=-3 \end{cases}$$

la circonferenza ha equazione. $x^2+y^2+3x-2y-3=0$

3. Rette secanti, tangenti o esterne ad una circonferenza

Dato il sistema formato dall'equazione della circonferenza e da quella della retta


$$\begin{cases} x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$$

nell'equazione di secondo grado che risolve il sistema (ricavando una delle due variabili in funzione dell'altra nella seconda equazione), abbiamo allora le tre possibilità alternative:

- $\Delta > 0$, la retta è *secante*;
- $\Delta = 0$, la retta è *tangente*;
- $\Delta < 0$, la retta è *esterna*.

Dato un punto $P(x_0; y_0)$ e una circonferenza di equazione $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$, nella ricerca delle *tangenti* condotte dal un punto P alla circonferenza, si possono presentare tre casi.

- P è esterno alla circonferenza, le *rette per P tangenti alla circonferenza sono due*;
- P appartiene alla circonferenza, la *retta tangente è una sola*;
- P è interno alla circonferenza, *non esistono rette tangenti uscenti da P*.



Per determinare le equazioni delle eventuali *rette tangenti*, si possono seguire due metodi.

IL METODO

- si scrive l'equazione del fascio di rette passanti per $P(x_0, y_0)$

$$y - y_0 = m(x - x_0);$$

- si scrive il sistema fra le equazioni del fascio e la circonferenza:

$$\begin{cases} y - y_0 = m(x - x_0) \\ x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \end{cases}; \quad \begin{cases} y = y_0 + m(x - x_0) \\ x^2 + (y_0 + m(x - x_0))^2 + \dots \end{cases}$$

- con il metodo di sostituzione si ottiene quindi un'equazione di secondo grado nella variabile x ;
- si impone la condizione di tangenza, ossia $\Delta = 0$;
- si risolve l'equazione di secondo grado rispetto a m ;
 se $m_1 \neq m_2$, le rette tangenti sono due e il punto P è esterno alla circonferenza;
 se $m_1 = m_2$, la retta tangente è una sola e il punto P appartiene alla circonferenza;
 se $m_1, m_2 \notin \mathbf{R}$, non esistono rette tangenti e il punto P è interno alla circonferenza;
- si sostituisce il valore o i valori trovati di m nell'equazione del fascio di rette.

N.B.: E' sempre conveniente controllare graficamente i risultati ottenuti...!

Esempio

Scrivere l'equazione delle rette passanti per $P(0, -4)$ e tangenti alla circonferenza $x^2 + y^2 = 4$.
 L'equazione della retta generica passante per P è:

$$y - (-4) = m(x - 0)$$

intersecando con la circonferenza otteniamo

$$\begin{cases} y = mx - 4 \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases}; \quad \begin{cases} y = mx - 4 \\ x^2(1 + m^2) - 8mx + 12 = 0 \end{cases}$$

imponendo $\frac{\Delta}{4} = 0$ si ottiene

$$\frac{\Delta}{4} = (4m)^2 - 12(1 + m^2) = 0$$

che ci dà coefficiente angolare delle rette tangenti $m = \pm\sqrt{3}$.

Le due rette quindi sono:

$$y = \pm\sqrt{3}x - 4$$

II METODO

- si determinano le coordinate del centro C e del raggio r della circonferenza;
- si scrive l'equazione del fascio di rette passanti per $P(x_0, y_0)$

