

Integrali in due variabili

1. Si esprima il dominio semplice $D \subset \mathbb{R}^2$ prima come dominio x -semplice e poi come dominio y -semplice. (Per esempio, se D è il disco unitario,

$$\begin{aligned} D &= \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq y \leq 1; -\sqrt{1-y^2} \leq x \leq \sqrt{1-y^2} \right\} \\ &= \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 1; -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2} \right\} \end{aligned}$$

(a) $D = [a, b] \times [c, d]$

(b) $D = \bar{U}((1, 1), 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1\}$

(c) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 4y^2 \leq 4\}$

(d) D è il triangolo di vertici $(0, 0)$; $(2, 2)$; $(0, 2)$

(e) D è il triangolo di vertici $(0, 0)$; $(2, 2)$; $(0, 1)$

(f) D è la regione del III quadrante compresa fra le curve $y = -x$ e $x = y^2$

2. Calcolare $\int_D f(x, y) dx dy$, dove:

(a) $f(x, y) = xy(x + y)$; $D = [0, 1]^2 = [0, 1] \times [0, 1]$

(b) $f(x, y) = \sqrt{y} + x - 3xy^2$; $D = [0, 1] \times [1, 3]$

(c) $f(x, y) = \sin(x + y)$; $D = [0, \pi/2]^2 = [0, \pi/2] \times [0, \pi/2]$

(d) $f(x, y) = x \cos(x + y)$; D è il triangolo di vertici $(0, 0)$; $(\pi, 0)$; (π, π)

(e) $f(x, y) = e^x$; D è il triangolo di vertici $(0, 0)$; $(1, 0)$; $(\frac{1}{2}, 1)$

(f) $f(x, y) = x^3 y$; D è la regione limitata del piano (x, y) compresa fra le curve $y = x^2$ e $y = (1-x)^2$

(g) $f(x, y) = y^2 \cos x$; D è la regione del piano (x, y) compresa fra la curva $y = \sin x$ e il segmento $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dell'asse x

(h) $f(x, y) = \sqrt{x + 2y + 1}$; D è la regione limitata del piano (x, y) compresa fra le curve $x = 2y$ e $x = y^2$

(i) $f(x, y) = \frac{x}{y}$; $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq y \leq 2; y \leq x \leq y^2\}$

(j) $f(x, y) = e^{x+y}$; D è il quadrato di vertici $(1, 0)$; $(0, 1)$; $(-1, 0)$; $(0, -1)$

3. Si consideri l'integrale doppio

$$I = \int_{-1}^1 \int_{|y|}^1 e^{-x^2} dx dy.$$

Questo corrisponde a $I = \int_D e^{-x^2} dx dy$ per una certa regione del piano D . Si disegni D . Inoltre, invertendo l'ordine di integrazione (cioè usando sezioni verticali invece che orizzontali) si calcoli I .

4. Calcolare il volume dei seguenti solidi \mathcal{S} :

(a) $\mathcal{S} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, y^2 \leq z \leq 1 + \sin(\pi x)\}$

(b) $\mathcal{S} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 - x, x + y \leq z \leq 10 - x + 2y\}$

(c) \mathcal{S} è il tronco di parallelepipedo limitato dai piani $x = 0$, $y = 0$, $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$ e $z = -x - 2y$

(d) \mathcal{S} è il solido del I ottante (il I ottante è la regione dello spazio (x, y, z) data da $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$) limitato dal piano $x + y + z = 1$.

5. Sia R il rettangolo $[a, b] \times [c, d]$ e $f : R \rightarrow \mathbb{R}$. Mostrare che, se $f(x, y) = g(x)h(y)$ e g e h sono due funzioni continue, allora

$$\int_R f(x, y) \, dx dy = \int_a^b g(x) \, dx \cdot \int_c^d h(y) \, dy.$$